

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน
ครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒

๑) หัวข้อเรื่อง สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19

ในขณะนี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญที่รัฐบาลไทยเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแนะนำวิธีการปฏิบัติตนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ดังนี้

- **ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19** ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย ๒ วัน เลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ และก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนควรปรึกษาหรือแจ้งข้อมูลสำคัญแก่แพทย์ เช่น โรคประจำตัวหรือยาที่ต้องรับประทาน ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน หรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ เป็นต้น

- **วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19** ควรดื่มน้ำอย่างน้อย ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ml สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียน และควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ในกรณีที่มีโรคประจำตัวสามารถทานยาได้ตามปกติ

- **หลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19**

- ต้องพักดูอาการ ณ จุดฉีดวัคซีน ๓๐ นาที หากมีอาการผิดปกติ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการรุนแรง เช่น ชากิ่งซิก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที และควรเลี่ยงการใช้แขนข้างที่ฉีดวัคซีน ในการยกของหนักอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง

- หลังการฉีดวัคซีน ๔-๖ ชั่วโมง หากมีไข้หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอล ขนาดตามน้ำหนักตัว ๑๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก ๔-๖ ชั่วโมง

- เมื่อกลับบ้านแล้ว ต้องสังเกตอาการต่ออีก ๒-๓ วัน หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชากิ่งซิก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒