

หลังรับ การฉีดวัคซีนโควิด 19




พักอาการ ณ จุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาที


หากมีอาการผิดปกติ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน
หรือมีอาการรุนแรง เช่น ชากริ่งชก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที




4-6 ชม.



ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาดตามน้ำหนักตัว
10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (500 มิลลิกรัม /50 กิโลกรัม) ทุก 4-6 ชั่วโมง
(ห้ามรับประทานยาจำพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด)



เมื่อกลับบ้านแล้ว ต้องสังเกตอาการต่ออีก 2-3 วัน หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง
เช่น ชากริ่งชก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที



เลี่ยงการใช้แขนขาที่ฉีด
ในการยกของหนักอย่างน้อย 4 ชั่วโมง