

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 38/2568 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานความครอบคลุมและความทันเวลาการรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ตามที่กรมควบคุมโรคได้มีการรวบรวมรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) นั้น สัปดาห์ที่ 38/2568 (14 – 20 กันยายน 2568) สถานพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 109 แห่ง มีการรายงาน 94 แห่ง ไม่ส่งรายงาน 15 แห่ง คิดเป็นความครอบคลุม ร้อยละ 86.24 และจำนวนรายงานที่ส่งทั้งหมด 2,318 รายงาน ส่งทันเวลาจำนวน 2,156 รายงาน คิดเป็นความทันเวลา ร้อยละ 93.01 โดยในกลุ่มที่มีการรายงาน พบว่า รายงานเป็น Zero report (ยืนยันว่าไม่มีผู้ป่วยที่ต้องรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา) จำนวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.54 ส่งรายงานทันเวลา >80% จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.86 และ ส่งรายงานทันเวลา <80% จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.83

สรุปสถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี ประจำสัปดาห์ที่ 38/2568

ในช่วงสัปดาห์ที่ 38/2568 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568) จังหวัดนนทบุรีมีจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวัง สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวนเท่ากับ 920 ราย รองลงมา คือ อุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก โรคปอดอักเสบ และติดเชื้อไวรัส RSV จำนวน 178, 100, 72 และ 64 ราย ตามลำดับ

สถานการณ์โรคระบบทางเดินหายใจ คือโรคไข้หวัดใหญ่ และ เกิดโรคติดเชื้อไวรัส RSV จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ 1 มกราคม -20 กันยายน 258 (สัปดาห์ที่ 38) พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปีในช่วงเวลาเดียวกัน โรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 36 (วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2568) โดยพบสูงสุดในสัปดาห์ที่ 37 (วันที่ 7 – 13 กันยายน 2568) ซึ่งคล้ายกับแนวโน้มการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส RSV ที่พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 28 (วันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2568) กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มเด็ก อายุ 0 - 14 ปี และผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่าโรคมือเท้าปาก ที่เป็นโรคในเด็กที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 37 (วันที่ 7 – 13 กันยายน 2568) และในสัปดาห์นี้ สัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568) พบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่ 3 ของสัปดาห์ ในการดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมโรค จึงควรเน้นมาตรการในสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก เพิ่มเติมจากมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงอื่น คือผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

โรคไข้เลือดออก สถานการณ์จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2568 พบผู้ป่วยสะสมจำนวนทั้งสิ้น 762 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 60.11 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.08 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง คือ อำเภอเมืองนนทบุรี อัตราป่วยเท่ากับ 73.14 รองลงมาคือ อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย อัตราป่วยเท่ากับ 65.58, 55.04, 50.57, 50.19 และ 45.21 ตามลำดับ และยังมีบางพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง ตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคและยุทธศาสตร์อย่างเข้มข้น โดยเน้นการสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เสี่ยง และให้ความรู้ประชาชนเรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง (ไม่ใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs) เพื่อควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่ต่อไป

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ จังหวัดนนทบุรี
Weekly Epidemiological Surveillance Report
สัปดาห์ที่ 38/2568 (ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2568 – 20 กันยายน 2568)

ตารางที่ 1 ความครอบคลุมการดำเนินการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนนทบุรี
 ตามประเภทสถานพยาบาล สัปดาห์ที่ 38/2568 ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2568

ประเภทสถานพยาบาล	สัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 - 20 กันยายน 2568)					
	ความครอบคลุม			ความทันเวลา		
	ทั้งหมด	ส่งรายงาน	ร้อยละ	จำนวนที่ส่ง	ทั้งหมด	ร้อยละ
โรงพยาบาล นอก สธ	1	1	100.00	168	168	100.00
โรงพยาบาล นอก สป. สธ.	2	2	100.00	492	492	100.00
โรงพยาบาลชุมชน	7	7	100.00	436	449	97.10
โรงพยาบาลศูนย์	1	1	100.00	193	313	61.66
โรงพยาบาลเอกชน	9	8	88.89	800	829	96.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	42	35	83.33	12	12	100.00
ศูนย์บริการสาธารณสุข	2	2	100.00	0	0	0.00
ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.	44	37	84.09	35	35	100.00
ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. / เมือง (ศสม.)	1	1	100.00	20	20	100.00
	109	94	86.24	2,156	2,318	93.01


ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 23 กันยายน 2568

ความครอบคลุม หมายถึง สถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในระบบ DDS รวมถึง
 การรายงาน Zero Report หรือ No Case Notification ด้วย

การรายงาน Zero report หรือ No Case Notification คือการรายงานสถานการณ์ที่ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคที่
 ต้องเฝ้าระวังในช่วงเวลาที่กำหนด

ความทันเวลา หมายถึง สถานพยาบาลที่มีจำนวนรายงานโรคในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัยมากกว่า
 80% ของจำนวนรายงานโรคในสัปดาห์ระบานั้นๆ

แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนการส่งรายงานตามประเภทสถานพยาบาล สัปดาห์ที่ 38/2568
ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2568



สัปดาห์ที่ 38/2568 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568) สถานพยาบาลในจังหวัดนนทบุรีจำนวนทั้งหมด 109 แห่ง มีการส่งรายงานตามวันเริ่มป่วย จำนวน 94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.24 และไม่ส่งรายงาน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.76 โดยในกลุ่มที่ส่งรายงาน พบว่า ส่ง Zero Report จำนวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.54 ส่งรายงานทันเวลา>80% จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.86 และ ส่งรายงานทันเวลา<80% จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.83

ตารางที่ 2 รายชื่อสถานพยาบาลที่ไม่ส่งรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 38
จำนวนทั้งหมด 15 แห่ง รายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทสถานพยาบาล	ชื่อหน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	รพ.สต.บางรักน้อย หมู่ที่ 3
	รพ.สต.คลองตากล้าย
	รพ.สต.วัดเต็มรัก ต.บางคูรัด
	รพ.สต.บ้านสุเหร่าแดง ต.ละหาร
	รพ.สต.โรงกระโจม ต.พิมลราช
	รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ ต.หนองเพรางาย
	รพ.สต.หมู่ที่ 8 บ้านไทยพุทธ ต.ท่าอิฐ
	รพ.รัตนธิเบศร์
ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.	รพ.สต.บางขุนกอง
	รพ.สต.หมู่ที่ 6 บ้านคลองโยง ต.บางใหญ่
	รพ.สต.หมู่ที่ 11 ต.บางรักใหญ่
	รพ.สต.สุเหร่าเขียว ต.ละหาร

ประเภทสถานพยาบาล	ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.	รพ.สต.วัดคลองขวาง ต.คลองขวาง
	ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน


ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 23 กันยายน 2568

สถานพยาบาลที่ไม่ส่งรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์

- ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

แผนภูมิที่ 2 จำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย 10 อันดับแรก จังหวัดนนทบุรี สัปดาห์ที่ 38/2568 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568)



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568


สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 38/2568 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568)
ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง DOE Portal : ลำดับโรคที่พบบ่อยประจำสัปดาห์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย ณ วันที่ 22 กันยายน 2568 พบว่าจังหวัดนนทบุรี มีผู้ป่วยที่ต้องรายงานในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตามวันและสถานที่เริ่มป่วยรวม 1,408 ราย โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวนเท่ากับ 920 ราย รองลงมา คือ อหิวาตกโรค โรคมือเท้าปาก โรคปอดอักเสบ และตีตราไวรัสอาร์เอสวี จำนวน 178, 100, 72 และ 64 ราย ตามลำดับ (แผนภูมิที่ 2)

สรุปสถานการณ์โรคที่น่าสนใจ

สรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) จังหวัด นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ตามวันที่เริ่มป่วย จำนวนทั้งสิ้น 15,160 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,195.80 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี จำนวน 2,846 ราย ร้อยละ 18.77 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 30-39 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี จำนวน 2,271 ราย และ 2,171 ราย ร้อยละ 14.98 และ 14.32 ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงอยู่ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาและวัยทำงาน อายุ 30 - 39 ปี


แผนภูมิที่ 3 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอปากเกร็ด อัตราป่วยเท่ากับ 1,443.34 รองลงมาคือ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย อัตราป่วยเท่ากับ 1,389.03, 1,348.83, 1,191.69, 837.97 และ 491.82 ตามลำดับ


แผนภูมิที่ 4 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

พิจารณาระยะเวลาการเกิดโรค พบว่าโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดนนทบุรี ปี 2568 มีจำนวนสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2563-2567) ในช่วงเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ต้นปี จนถึงสัปดาห์ที่ 22 ช่วงระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2568 เริ่มมีจำนวนน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 36 (วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2568) พบว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 37 (วันที่ 7 – 13 กันยายน 2568) พบผู้ป่วยจำนวน 1,182 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับในสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568) พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 920 ราย ซึ่งลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 262 ราย แต่ยังคงสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 3 เท่า

แผนภูมิที่ 5 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนนทบุรี เปรียบเทียบข้อมูลปี 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2567) และปี 2567




ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

สรุปรายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) จังหวัด นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) จำนวนทั้งสิ้น 5,229 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 412.46 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.16 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.04 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.94 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี ร้อยละ 24.94 ซึ่งกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบในจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป และเด็กเล็ก 0 - 4 ปี) โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ส่วนมากเป็นกลุ่มที่อยู่ในที่พัก

แผนภูมิที่ 6 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดนนทบุรี

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568




ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอบางใหญ่ อัตราป่วยเท่ากับ 533.79 รองลงมาคือ อำเภอบางกรวย อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย อัตราป่วยเท่ากับ 530.70, 491.31, 346.76, 346.48 และ 164.40 ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 7 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคปอดอักเสบ จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด นนทบุรี


ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

แผนภูมิที่ 8 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนนทบุรี

เปรียบเทียบข้อมูลปี 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2567) และปี 2567



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568


พิจารณาระยะเวลาการเกิดโรค พบว่าโรคปอดอักเสบจังหวัดนนทบุรี ปี 2568 มีจำนวนสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2563-2567) ในช่วงเวลาเดียวกันตั้งแต่ต้นปีมาโดยตลอด และในสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568) พบผู้ป่วยรายใหม่ 72 ราย ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา 73 ราย น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 3 เท่า และใกล้เคียงกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

สรุปรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 20 กันยายน 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส RSV ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย จำนวนทั้งสิ้น 726 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 78.09 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี จำนวน 560 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.13 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี จำนวน 103 ราย คิดเป็น ร้อยละ 14.19 ซึ่งกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี


แผนภูมิที่ 9 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส RSV จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดนนทบุรี

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568




ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

แผนภูมิที่ 10 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัส RSV จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568
อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอบางกรวย อัตราป่วยเท่ากับ 88.41 รองลงมาคือ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย อัตราป่วยเท่ากับ 58.56, 55.67, 47.63, 45.62 และ 19.25 ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 11 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส RSV จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

พิจารณาระยะเวลาการเกิดโรค พบว่าโรคติดเชื้อไวรัส RSV จังหวัดนนทบุรี ปี 2568 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 – 8 ไม่มีการรายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) โดยเริ่มมีการรายงานโรคในสัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2568) พบรายงานผู้ป่วยจำนวน 3 ราย และพบว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 28 (วันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2568) มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 37 (วันที่ 7 – 13 กันยายน 2568) จำนวน 96 ราย สำหรับสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568) พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 64 ราย มีจำนวนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวน 32 ราย


สถานการณ์โดยรวมของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในจังหวัดนนทบุรี พบว่ากลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเด็ก (0-15 ปี) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่สำคัญของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ คือ การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้มีโรคประจำตัว ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเท่าคนทั่วไป หรือมีภาวะสุขภาพที่เอื้อต่อการเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อได้ง่ายกว่า ดังนั้นการเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันในกลุ่มนี้จึงต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ

1. หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 70%
2. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก
3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และใช้ภาชนะส่วนตัว
4. หากมีอาการสงสัย เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK และแยกตัวจากผู้อื่น
5. หากมีอาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก ให้รีบพบแพทย์ทันที

สรุปรายงานสถานการณ์โรคอุจจาระร่วง (Acute diarrhea) จังหวัด นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 20 กันยายน 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย จำนวนทั้งสิ้น 11,997 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 946.30 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 30 - 39 ปี จำนวน 2,130 ราย ร้อยละ 17.75 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 20 - 29 และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,907 ราย และ 1,721 ราย ร้อยละ 15.90 และ 14.35 ตามลำดับ


แผนภูมิที่ 12 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568


อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอเมืองนนทบุรี อัตราป่วยเท่ากับ 1,402.35 รองลงมาคือ อำเภอบางกรวย อำเภopakเกร็ด อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย อัตราป่วยเท่ากับ 968.01, 872.23, 604.06, 588.27 และ 565.86 ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 13 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด นนทบุรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

แผนภูมิที่ 14 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนนทบุรี เปรียบเทียบข้อมูลปี 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2567) และปี 2567




ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

ในปี 2567 โรคอุจจาระร่วงไม่ได้รายงานใน D506 แต่จัดอยู่ในกลุ่มโรคเฝ้าระวังอาการ ทำให้ค่ามัธยฐานที่ได้จึงเป็นมัธยฐาน 4 ปี ในปี 2568 มีการปรับให้เป็นโรคที่ต้องรายงานการเฝ้าระวัง ซึ่งมีการรายงานพบผู้ป่วยต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เฉลี่ยประมาณ 322 รายต่อสัปดาห์ และในสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568) มีรายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ 178 ราย ซึ่งน้อยกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา 116 ราย

สรุปรายงานสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก (Hand foot and mouth disease) จังหวัด นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568


นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 20 กันยายน 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย จำนวนทั้งสิ้น 1,540 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 126.21 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี จำนวน 868 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.36 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จำนวน 561 ราย คิดเป็น ร้อยละ 36.43

แผนภูมิที่ 15 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

แผนภูมิที่ 16 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคมือ เท้า ปาก จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568




ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอไทรน้อย อัตราป่วยเท่ากับ 171.94 รองลงมาคือ อำเภopakเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย และอำเภอบางใหญ่ อัตราป่วยเท่ากับ 136.81, 121.08, 112.66, 102.61 และ 76.23 ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 17 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนนทบุรี

เปรียบเทียบข้อมูลปี 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2567) และปี 2567




ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

พิจารณาระยะเวลาการเกิดโรค พบว่าโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดนนทบุรี ปี 2568 มีจำนวนสูงกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2563-2567) แต่น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 2568 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 26 (วันที่ 22-28 มิถุนายน 2568) พบมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 37 (วันที่ 7 - 13 กันยายน 2568) พบผู้ป่วยรายใหม่ 188 ราย และในสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 - 20 กันยายน 2568) พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 100 ราย น้อยกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 88 ราย

สรุปรายงานสถานการณ์โรคซิฟิลิส (Syphilis, Congen) จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคซิฟิลิส ตามวันที่เริ่มป่วย จำนวนทั้งสิ้น 497 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 41.48 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี จำนวน 208 ราย ร้อยละ 41.85 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 30-39 ปี และกลุ่มอายุ 15 -19 ปี จำนวน 94 ราย และ 67 ราย ร้อยละ 18.91 และ 13.48 ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงอยู่ในกลุ่มนักเรียนมัธยม นักศึกษาและวัยทำงาน อายุ 15 - 49 ปี


แผนภูมิที่ 18 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคซิฟิลิส จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอบางใหญ่ อัตราป่วยเท่ากับ 49.43 รองลงมา คือ อำเภอบางกรวย อำเภอไทรน้อย อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง และอำเภอเมืองนนทบุรี อัตราป่วยเท่ากับ 44.27, 41.95, 41.05, 40.71 และ 37.10 ตามลำดับ


แผนภูมิที่ 19 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคซิฟิลิส จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

แผนภูมิที่ 20 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคซิฟิลิส จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนนทบุรี

เปรียบเทียบข้อมูลปี 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2567) และปี 2567




ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

จากการพิจารณาระยะเวลาการเกิดโรคซิฟิลิส จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2568 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ 4-14 และสัปดาห์ที่ 22-34 อีกทั้งยังพบช่วงที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้แก่ สัปดาห์ที่ 6-10 และสัปดาห์ที่ 24-26 ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์การระบาดที่ควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 - 20 กันยายน 2568) พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 6 ราย ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 7 ราย

สรุปรายงานสถานการณ์โรคสุกใส (Varicella, Chickenpox) จังหวัด นนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568


นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 20 กันยายน 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคสุกใส ตามวันและสถานที่เริ่มป่วย จำนวนทั้งสิ้น 560 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 44.61 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จำนวน 145 ราย ร้อยละ 25.89 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี และกลุ่มอายุ 0-4 ปี จำนวน 92 ราย และ 80 ราย คิดเป็น ร้อยละ 16.43 และ 14.29 ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี

แผนภูมิที่ 21 ร้อยละผู้ป่วยด้วยโรคสுகไส จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 23 กันยายน 2568

แผนภูมิที่ 22 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคสுகไส จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568




ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 23 กันยายน 2568

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอไทรน้อย อัตราป่วยเท่ากับ 81.00 รองลงมา คือ อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี อัตราป่วยเท่ากับ 56.47, 52.32, 43.41, 42.25, 27.53 ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 23 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคสุกใส จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนนทบุรี

เปรียบเทียบข้อมูลปี 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2567) และปี 2567



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 23 กันยายน 2568

พิจารณาระยะเวลาการเกิดโรค พบว่าโรคสุกใสจังหวัดนนทบุรี ปี 2568 มีจำนวนสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2563-2567) ในช่วงเวลาเดียวกันตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการระบาดของโรคในพื้นที่ แต่ไม่มีการรายงานเป็นกลุ่มก้อน และในสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 - 20 กันยายน 2568) พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 15 ราย ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา 2 ราย


โรคสุกใสเกิดจากการติดเชื้อไวรัส “เชื้ออีสุกอีใส-สุวัด” ซึ่งเป็นไวรัสที่มีชื่อว่า “ไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์” (Varicella zoster virus – VZV) หรือ Human herpesvirus type 3 (HHV-3) โดยเชื้อมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดโรคอีสุกอีใสในผู้ที่เพิ่งติดเชื้อเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นเชื้อจะหลบซ่อนอยู่ในปมประสาท เมื่ออายุมากขึ้นหรือภูมิคุ้มกันต่ำลง เชื้อที่หลบซ่อนอยู่ก็จะเจริญเติบโตขึ้นใหม่ก่อให้เกิดโรคอีสุกอีใส ผู้ป่วยจะสามารถแพร่เชื้อโรคได้ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงก่อนผื่นขึ้น จนผื่นแห้งเป็นสะเก็ดทั้งหมด

สรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก (DF DHF DSS) จังหวัด นนทบุรี

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568

สถานการณ์ไข้เลือดออก ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568 ประเทศไทยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 45,137 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 68.32 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตสะสม 39 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.09 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือกลุ่มอายุ 5 - 14 ปี อัตราป่วย 184.81 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี และ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 125.37 , 90.62 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยเรียนและกลุ่มเด็ก จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ ลำพูน เท่ากับ 316.99 รองลงมาคือ ภูเก็ต เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และสุราษฎร์ธานี อัตราป่วยเท่ากับ 307.45 , 230.17 , 217.38 และ 168.91 ตามลำดับ


แผนภูมิที่ 24 อัตราป่วยสะสมด้วยโรคไข้เลือดออก 5 อันดับแรก รายจังหวัด ตั้งแต่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2568



ที่มา กองโรคติดต่อภายใน กรมควบคุมโรค วันที่ 22 กันยายน 2568

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2568 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 2,578 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 48.37 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตรามรณะ 0.038 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี ร้อยละ 19.32 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 30-39 ปี และ กลุ่มอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 17.81 และ 13.19 ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 20 - 39 ปี) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ ปทุมธานี เท่ากับ 74.61 รองลงมาคือ นนทบุรี และ นครนายก อัตราป่วยเท่ากับ 60.11 และ 53.09 ตามลำดับ


แผนภูมิที่ 25 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 4 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 – 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

สำหรับจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 20 กันยายน 2568 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสม จำนวนทั้งสิ้น 762 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 60.11 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็น อัตราตาย 0.08 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 18.64 รองลงมาคือ กลุ่ม อายุ 20 - 29 ปี และ กลุ่มอายุ 40 - 49 ปี ร้อยละ 17.59 และ 12.86 ตามลำดับ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน (อายุ 20-49 ปี)


แผนภูมิที่ 26 ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568


พิจารณารายพื้นที่ ตามอัตราป่วยต่อแสนประชากร พบว่าอำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูง คือ อำเภอเมืองนนทบุรี อัตราป่วยเท่ากับ 73.14 รองลงมาคือ อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย อัตราป่วยเท่ากับ 65.58, 55.04, 50.57, 50.19 และ 45.21 ตามลำดับ

แผนภูมิที่ 27 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2568



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

แผนภูมิที่ 28 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนนทบุรี
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี และปี 2567



ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/> วันที่ 22 กันยายน 2568

พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วย ปี 2568 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนใกล้เคียงกับมัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 20 (วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2568) เริ่มมีจำนวนมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงสัปดาห์ที่ 34 (วันที่ 17 -23 สิงหาคม 2568) มีแนวโน้มผู้ป่วยลดลงต่ำกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2567 สัปดาห์ที่ 37 (วันที่ 7 – 13 กันยายน 2568) มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 29 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 36 (วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2568) จำนวน 10 ราย สัปดาห์ ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568) มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 14 ราย (สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 29 ราย) ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 15 ราย

จากข้อมูลข้างต้น จังหวัดนนทบุรี มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเป็นอันดับที่ 37 ของประเทศ และมีอัตราป่วยสะสมสูงเป็นอันดับที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 4 ด้วยอัตราป่วย 60.11 ต่อประชากรแสนคน

ตารางที่ 3.1 การกระจายผู้ป่วยไข้เลือดออก แยกรายตำบล อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

สัปดาห์ที่ 27 (วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2568) ถึงสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568)

อำเภอ	ตำบล	สัปดาห์												
		ผู้ป่วยสะสม	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
ไทรน้อย	คลองขวาง	3		1				1						
	ทวีวัฒนา	7			1									
	ราษฎร์นิยม	2											1	
	หนองเพรางาย	10	2		1	1	2	1		1		1		
	ไทรน้อย	5						1	1		1	2		
	ไทรใหญ่	6						1	1	1		2	1	

อำเภอไทรน้อย พื้นที่ที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง คือ ตำบลหนองเพรางาย โดยพบผู้ป่วยรายแรกในสัปดาห์ที่ 26 (วันที่ 22-26 มิถุนายน 2568) และพบผู้ป่วยต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ 29 ถึงสัปดาห์ที่ 34 ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ 35 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 1 ราย ตำบลไทรใหญ่พบผู้ป่วยต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ 32 (วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2568) ถึง สัปดาห์ที่ 37 (วันที่ 7 – 13 กันยายน 2568) ตำบลราษฎร์นิยมพบผู้ป่วยรายใหม่ของตำบล จำนวน 1 ราย

ตารางที่ 3.2 การกระจายผู้ป่วยไข้เลือดออก แยกรายตำบล อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สัปดาห์ที่ 27 (วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2568) ถึงสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568)

อำเภอ	ตำบล	สัปดาห์													
		ผู้ป่วยสะสม	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
บางกรวย	บางกรวย	7		1	1							1	1	2	
	บางขุน	6	1				4								
	บางขุนกอง	11				2		1	1	1	1				
	บางคูเวียง	9		1				1					1		
	บางสีทอง	2		1											
	ปลายบาง	7	1										1		
	มหาสวัสดิ์	11			1		2			1					
	วัดชะลอ	2			1										
	ศาลากลาง	16			3	2	1	1	1						

อำเภอบางกรวย พบผู้ป่วยประปรายในพื้นที่ทุกตำบล พื้นที่ที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้น แต่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องที่ตำบลบางกรวย ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 36 (วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2568) จนถึงสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568) ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตารางที่ 3.3 การกระจายผู้ป่วยไข้เลือดออก แยกรายตำบล อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สัปดาห์ที่ 27 (วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2568) ถึงสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568)

อำเภอ	ตำบล	สัปดาห์													
		ผู้ป่วยสะสม	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
บางบัวทอง	บางคูรัด	14		1		2	1		1	1					
	บางบัวทอง	38	1		2	2	5	6	4	1	1			1	
	บางรักพัฒนา	29	3	3	3	1		2				2			
	บางรักใหญ่	4	2		1										
	พิมลราช	19		1			2	1	1	1				1	
	ละหาร	15		1	1	1		3	2						
	ลำโพ	16	4		2	1				1			1		
	โสนลอย	7	2									2	2		

อำเภอบางบัวทอง พบผู้ป่วยประปรายในพื้นที่ทุกตำบล พื้นที่ที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ตำบลบางบัวทอง และตำบลพิมลราช ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ตำบลบางบัวทองพบผู้ป่วยรายใหม่ในสัปดาห์ที่ 38 และตำบลพิมลราชพบผู้ป่วยรายใหม่ในสัปดาห์ที่ 38

ตารางที่ 3.4 การกระจายผู้ป่วยไข้เลือดออก แยกรายตำบล อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สัปดาห์ที่ 27 (วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2568) ถึงสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568)

อำเภอ	ตำบล	สัปดาห์													
		ผู้ป่วยสะสม	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
บางใหญ่	บางม่วง	3						1							
	บางเลน	10						1	1	1	1				
	บางแม่นาง	22	3	1	1	1	1	2	1	1	1				
	บางใหญ่	15		1	2			1	1			1	2		
	บ้านใหม่	8				1	1	2	2						
	เสาธงหิน	24	2	3	1		1	3	2	1		1			

อำเภอบางใหญ่ พบผู้ป่วยในพื้นที่ทุกตำบล พื้นที่ที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ตำบลบางแม่นางพบผู้ป่วยต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ 26 ถึงสัปดาห์ที่ 35 ตำบลบางเลนมีผู้ป่วยต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 32 – 35) ตำบลบางใหญ่ พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ 36 สัปดาห์ 37 (วันที่ 7 – 13 กันยายน 2568) อำเภอบางใหญ่ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 3.5 การกระจายผู้ป่วยไข้เลือดออก แยกรายตำบล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สัปดาห์ที่ 27(วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2568) ถึงสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568)

อำเภอ	ตำบล	สัปดาห์													
		ผู้ป่วยสะสม	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
ปากเกร็ด	คลองข่อย	13	1		1		1	2			1	1		1	
	คลองพระอุดม	5			1					1			2		
	คลองเกลือ	7							2						
	ท่าอิฐ	10			1	1	1			1				1	
	บางตลาด	21	4	1			1		1	1					
	บางตะไนย์	5	1						1	1			1		
	บางพลับ	9					1		3		1	1		1	
	บางพูด	33	1	1	1	4	3	1	1	4	1				
	บ้านใหม่	24		1	3	1		3		2	3	1		1	
	ปากเกร็ด	28		2	3	2		1	4	1			2		
	อ้อมเกร็ด	1													
	เกาะเกร็ด	10									2				

อำเภอปากเกร็ด พบผู้ป่วยในพื้นที่ทุกตำบล พื้นที่ที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางพลับ และตำบลคลองข่อย ควรดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และในสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 4 – 20 กันยายน 2568) พบผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลคลองคลองข่อย ตำบลท่าอิฐ ตำบลบางพลับ และตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ดควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

ตารางที่ 3.6 การกระจายผู้ป่วยไข้เลือดออก แยกรายตำบล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สัปดาห์ที่ 27(วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2568) ถึงสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568)

อำเภอ	ตำบล	สัปดาห์															
		ผู้ป่วยสะสม	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
เมืองนนทบุรี	ตลาดขวัญ	42	3	2	2		1	2	2	1			1				
	ท่าทราย	41	4		3	3	2		2	2	2	1					
	บางกระสอ	36	4	1	3	4		1	3	1		2	2	1			
	บางกร่าง	17			1		3	3	1			1	1				
	บางรักน้อย	10		2	1	1*	1	2		1							
	บางศรีเมือง	17	1		1	1	2		2		1	1					
	บางเขน	62	5	3	4	3	2	5	3	1	2	2	3	1			
	บางไผ่	6	1						1			2					
	สวนใหญ่	7			2			2		1			1				
	ไทรมา	12		1		1		2	1	1			1				

หมายเหตุ *ผู้ป่วยเสียชีวิต

อำเภอเมืองนนทบุรี พบผู้ป่วยกระจายในพื้นที่ทุกตำบล พื้นที่ที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลท่าทราย และตำบลไทรมา โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องกันทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบัน โดยพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมสูงสุดคือ ตำบลบางเขน จำนวน 62 ราย ควรดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์ที่ 38 (วันที่ 14 – 20 กันยายน 2568) พบผู้ป่วยเพิ่มที่ตำบลบางกระสอ ตำบลบางเขน ถ้าพิจารณาตามพื้นที่จะพบพื้นที่ที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องจะอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ที่มา ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>

ณ วันที่ 22 กันยายน 2568

จากสถานการณ์ไข้เลือดออกข้างต้น จังหวัดนนทบุรี ยังมีการรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด บางกรวย บางบัวทอง และบางใหญ่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะนำโรค คือการสำรวจลูกน้ำยุงลายให้มีค่า HI CI น้อยกว่าร้อยละ 5 ควบคุมโรคได้ตามมาตรการ 3-3-1 และให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เรื่องการไม่ใช้ยา NSAIDs